

إن التصرف السريع عند ملاحظة علامات الولادة المبكرة يمكن أن يساعدك أنت وطفلك في الحصول على أفضل رعاية. اتصلي على فرز حالات الأمومة الآن (الرقم أدناه). أخبري القابلة بالأعراض التي تعاني منها. يمكن أن تطرح أسئلة لمعرفة ما إذا كنت أنت أو طفلك بحاجة إلى أي فحوصات. سنقتراح القابلة ما يجب فعله بعد ذلك إذا لم تتمكني من التحدث عبر الهاتف، يمكنك الذهاب إلى قسم فرز حالات الأمومة شخصياً.



الهاتف



مع الشكر لمشروع Women's CHAI Project
على نصائحهم ودعمهم لهذا المشروع

متى يولد الأطفال الرضع؟



طفل واحد من كل 250 مولودًا أقل من 27 أسبوعًا

طفلان من أصل 250 مولودًا أكثر من 27 أسبوعًا لأقل من 32 أسبوعًا

18 طفلًا من أصل 250 مولودًا أكثر من 32 أسبوعًا لأقل من 37 أسبوعًا

229 طفلًا رضيعًا من أصل 250 مولودًا أكثر من 37 أسبوعًا

8.6% من الأطفال الرضع يولدون مبكرًا. **1** من كل **12** طفلًا مبكرًا.

37 أسبوعًا هي مدة الحمل الكاملة

يولد معظم الأطفال بعد 37 أسبوعًا من الحمل. لكن حوالي 1 من كل 12 طفلًا يولد مبكرًا. قد يحتاج الأطفال المولودون مبكرًا أو الخدج إلى رعاية إضافية بعد الولادة في وحدة حديثي الولادة. كلما ولد الطفل مبكرًا، زادت احتمالية احتياجه إلى رعاية إضافية.



وفي شمال غرب إنجلترا، وُلد 73468 طفلًا بين أبريل 2022 ومارس 2023. ومن بين هؤلاء، ولد 6301 طفلًا رضيعًا (8.6%) مبكرًا، قبل 37 أسبوعًا. تم جمع هذه البيانات من قبل شبكة تسليم العمليات الجراحية لحديثي الولادة في الشمال الغربي.

هل هذا


مقبول لي

ولطفلي؟




علامات تشير إلى أن طفلك قد يولد مبكرًا


Arabic



نزيف أو بقع دموية
في الأسفل




سائل لزج أو كريمي
في الأسفل



تدفق أو تنقيط السوائل
في الأسفل



ألم الظهر



الألم أو الضغط
في الأسفل



ألم في المعدة أو تصلب المعدة
(انقباضات)

